

# Avertissements agricoles

33M - 10 mai 1993

## GRANDES CULTURES SEMENCES N° 5

(en collaboration avec les SUAD du Gard et de l'Hérault et les Coopératives SUD-CEREALES et de BARJAC)

### BLE DUR ..... MALADIES .....

Dans les situations non traitées à ce jour **ROUILLE BRUNE** et /ou **SEPTORIOSE** et/ou **OIDIUM** sont présents sur les étages foliaires supérieurs :

==> avec cette pression de maladies vous êtes susceptibles de perdre 10 à 30 qx en l'absence de protection


### SITUATION

#### # Stades :

moyen général : épiaison. Les parcelles les plus précoces sont à floraison et les plus tardives à gonflement

#### # Météo :

Les pluies généralisées et abondantes depuis 3 semaines, ont fait progresser les maladies. Le temps lourd actuel, et, les orages annoncés et prévisibles d'ici la fin du mois vont amplifier les dégâts



732



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
ZAC D'ALCO B.P.3056  
34034 MONTPELLIER CEDEX 01  
Tél : 67.10.19.50

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON  
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'inscription 531 AD  
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.  
C.C.P. MONTPELLIER 5238-12 G


## # Maladies :

### 1. Septoriose :

- Elle est présente sur l'ensemble de la région quel que soit la variété. le plus souvent sur F4 et F3, quelquefois sur F2. *Attention, son passage sur épi est très préjudiciable !....*

### 2. Rouille brune :

- La pression s'est fortement accentuée en zone sensible (Camargue, bordure littorale et Beaucaire-Tarascon). En situation non traitée et de variétés sensibles, la F1 est quasiment détruite.
- Elle a gagné les zones moyennement et peu sensibles, et, s'observe particulièrement dans la plaine de Nîmes, Uzès, Castries, ...



### 3. Oïdium :

Toujours en développement, quelquefois présent jusqu'à la F1 et barbes. *Attention, son passage sur épi est également très préjudiciable !....*

### 4. Pucerons :

- Ils ont été observés localement sur les étages foliaires supérieurs et sur épis. Les prédateurs (coccinelles, syrphes, ...) étant encore relativement peu présents, un traitement insecticide est à réaliser dans certaines situations ==> ALLEZ OBSERVER et RAJOUTER, au besoin un insecticide - type pyréthrinoloïde - à la bouillie fongicide.

## PRECONISATION

1. Cette année, toutes les parcelles doivent être traitées au moins 1 fois à gonflement-épiaison

2.

- Vous n'avez pas traité à ce jour : Intervenez dès réception de ce message, quelle que soit la variété.
- En zones sensibles, si vous avez traité il y a 3 semaines ou plus, renouvelez la protection contre la rouille brune et/ou l'oïdium.

## PRODUITS UTILISABLES

- Variétés peu ou pas sensibles à la rouille brune, privilégiez les spécialités : TENERE, ARCHER, EVREST, PLUTON, MELTOP également efficaces sur oïdium, ou ERIA, GRANIT, POLKA, PUNCH CS, TILT C plus "spécifiquement septoriose".
- Variétés sensibles à la rouille brune, privilégiez les spécialités du type ALTO, ALTO-Ambel, ALTO-Marathon, ARPEGE, ARPEGE-Epi, EMINENT, EMINENT-Star, HORIZON, LIBERO, OPUS, PLANETE R, SPOT, SPOTZ.  
Avec une forte présence d'oïdium utilisez un des produits ci-dessus + BOSCOR (0,5 l) ou ROCKETT-Ultra (0,7 l), ou, AURORE, JUPITER, OPUS Team.